


Freisetzungprofil von PerioChip®



- › Wirkstoffkonzentration in den ersten 24 Stunden am höchsten
- › Garantierte Dosis von 125 µg/ml in den ersten 7 Tagen
- › Langsame Abnahme der Chlorhexidinkonzentration in 7 Tagen

➤ Die zuverlässige Lösung in der Parodontitis-Therapie

Einfach effektiv in der Parodontitis-Therapie



Bestellen Sie PerioChip® bei unserem kostenfreien Beratungsservice:
0800 2843742 oder unter **www.periochip.de**
 Für Österreich: **0800 293628**

Dexcel Pharma GmbH
 Carl-Zeiss-Straße 2, 63755 Alzenau, Deutschland

PerioChip® 2,5 mg Insert für Parodontaltaschen

Wirkst.: Chlorhexidinbis(D-gluconat). **Zus.**: 2,5 mg Chlorhexidinbis(D-gluconat) **Sonst. Best.**: Hydrolys. Gelatine (vernetzt m. Glutaraldehyd), Glycerol, Gereinig. Wasser. **Anw.**: In Verb. m. Zahnsteinentfern. u. Wurzelbehandl. zur unterstütz. bakteriostat. Behandl. v. mäßig. bis schwer. chron. parodont. Erkr. m. Taschenbildg. b. Erwachs., Teil ein. parodont. Behandl. programms. **Gegenanz.**: Überempf. geg. Chlorhexidinbis(D-gluconat) o. ein. d. sonst. Bestandt. **Nebenw.**: Bei ungef. ein. Drittel der Pat. treten währ. d. erst. Tage n. Einleg. d. Chips Nebenw. auf, die normalerw. vorübergeh. Natur sind. Diese könn. auch a. mechan. Einleg. d. Chips in Parodontaltasche od. a. vorhergeh. Zahnsteinentferng. zurückzuf. sein. Am häufigst. treten Erkr. des Gastroint. tr. (Reakt. an d. Zähnn., am Zahnfleisch o. den Weichteil. i. Mund), auf, d. auch als Reakt. am Verabr.ort beschrieb. werd. könn. **Sehr häuf.**: Zahnschmerzen; **Häuf.**: Zahnfleischschwell., -schmerz., -blutung.; **Geleg.**: Infekt. d. ob. Atemwege, Lymphadenopathie, Schwindel, Neuralgie, Zahnfleischhyperplasie, -schrumpfg., -juckreiz, Mundgeschwüre, Zahnempfindl., Unwohlsl., grippeähnl. Erkrank., Pyrexie. **Nicht bek.**: Überempfindl. (einschl. anaph. Schock), allerg. Reakt. w. Dermatitis, Pruritus, Erythem, Ekzem, Hautausschl., Urticaria, Hautreiz. u. Blasenbildg.; **aus Berichten nach Zulassg.**: Zellgewebsentzünd. u. Abszess am Verabr.ort, Geschmacksverlust, Zahnfleischverfärbg. **Weitere Hinw.**: s. Fachinform. **Apothekenpflichtig. Stand:** 06/2020. **Pharmaz. Untern.:** Dexcel® Pharma GmbH, Carl-Zeiss-Straße 2, 63755 Alzenau, Deutschland, Tel.: +49 (0) 6023 94800, Fax: +49 (0) 6023 948050

¹ Soskolne, W.A. et al. (1997): Sustained Local Delivery of Chlorhexidine in the Treatment of Periodontitis. A Multi-Center Study. J Periodontol, Vol. 68, Nr. 1, p. 32-36.

² Soskolne, W.A. et al. (2003): Probing Depth Changes Following 2 Years of Periodontal Maintenance Therapy Including Adjunctive Controlled Release of Chlorhexidine. J Periodontol, Vol. 74, Nr. 4, p. 420-427.

SRP plus PerioChip®

Das eingespielte Team bei mäßiger bis schwerer Parodontitis



PerioChip®

Die zuverlässige Lösung in der Parodontitis-Therapie

Was ist PerioChip®

PerioChip® ist ein hauchdünner Matrix-Chip zur unterstützenden Parodontitis-Therapie, welcher sich 7 Tage nach der Applikation vollständig auflöst und somit nicht entfernt werden muss.

- › Wirksam – Eliminiert bis zu 99 % der pathogenen Keime
- › Schnell – Applikation in nur 1 Minute
- › Nachhaltig – Keimfernhaltend bis zu 11 Wochen
- › Beständig – Essentieller Teil eines parodontalen Behandlungsprogramms

SRP plus PerioChip®

Zusammen erstklassig

Für bestmögliche Therapieerfolge bei mäßiger bis schwerer Parodontitis ist **neben einer SRP* wichtig, die Zahnfleischtaschen medikamentös zu versorgen**. Das übernimmt PerioChip® mit seinem hochkonzentrierten Wirkstoff (ca. 36 %) Chlorhexidinbis(D-gluconat).

Die minimalinvasive Therapie SRP plus PerioChip® sollte einem chirurgischen Eingriff vorgezogen werden. Bringt diese nicht den gewünschten Behandlungserfolg, ist der chirurgische Eingriff noch immer eine Option.

SRP plus PerioChip®
**reduziert Taschentiefen
signifikant besser** als SRP allein.¹

*Scaling und Root Planing

Schnell und einfach appliziert – in nur einer Minute



1.

Nach Taschenreinigung den PerioChip® vorsichtig mit der Pinzette aus dem Einzelblister entnehmen.



2.

Mit der abgerundeten Seite voran in die parodontale Tasche applizieren.



3.

Den PerioChip® anschließend auf den Taschenfundus schieben.



Für bestmögliche Therapieerfolge:
PerioChip® alle 3 Monate applizieren.
Für **Zahnfleischtaschen ab 5 mm** Tiefe.

SRP plus PerioChip®

Langfristig und nachhaltig therapieren

Ein **3-Monats-Recall** gewährleistet eine rechtzeitige Wiederholung der Chip-Applikation, um den **Behandlungserfolg abzusichern**.

SRP plus PerioChip®:
Signifikante Reduktion der Taschentiefe an 73 % der behandelten Stellen durch regelmäßige Recalls über 2 Jahre nachgewiesen.²



Optimal für die Langzeittherapie

- › PerioChip® löst sich vollständig auf
- › Antibiotikafrei
- › Applikation kann beliebig oft wiederholt werden